

ПРИЧИНЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ

- ✓ Психологические особенности ребёнка;
- ✓ Социальные проблемы (семейное неблагополучие, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и т.д.), с которыми подросток встречается в жизни;
- ✓ Стремление убежать от действительности и испытать «кайф»;
- ✓ Стремление показать себя причастным к группе сверстников, в которой вдыхают ядовитые пары;
- ✓ Интерес.

Подозрения о возможном употреблении ребёнком токсических веществ должны возникнуть, если

- От одежды появился специфический запах бытовой химии.
- Нарушается координация движений, ребёнок, как правило, ведёт себя как пьяный, но запах алкоголя не ощущается.
- Зрачки расширены, слезятся глаза, покраснение склер (белка глаза).
- Гиперемия (покраснение лица), в случае тяжёлого отравления – бледность.
- Область носогубного треугольника приобретает синюшный оттенок.
- Выраженная агрессивность ребёнка или вялость и апатия.
- Если застали ребёнка на стадии галюцинаций – нарушена ориентация в месте и во времени, отмечается эйфория, безудержный смех.
- При выраженной интоксикации – тошнота, рвота, головокружение, вплоть до потери сознания.

Осторожно газ! Токсикомания. Сниффинг



Сниффинг – это форма токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается в результате вдыхания паров химических соединений используемого в бытовых приборах газа, летучих веществ, которые имеют свободное обращение в гражданском обороте (клей, газ из зажигалки, дезодоранты, освежители воздуха, очистительные жидкости и т.д.)